

In the name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful



Copyright disclaimer

"La faculté" is a website that collects medical documents written by Algerian assistant professors, professors or any other health practicals and teachers from the same field.

Some articles are subject to the author's copyrights.

Our team does not own copyrights for some content we publish.

"La faculté" team tries to get a permission to publish any content; however , we are not able to contact all authors.

If you are the author or copyrights owner of any kind of content on our website, please contact us on: facadm16@gmail.com to settle the situation.

All users must know that "La faculté" team cannot be responsible anyway of any violation of the authors' copyrights.

Any lucrative use without permission of the copyrights' owner may expose the user to legal follow-up.



UNIVERSITE D'ALGER - FACULTE DE MEDECINE ZIANIA CHATEAUNEUF – DEPARTEMENT DE MEDECINE. PREMIERE ANNEE DE MEDECINE ET DE MEDECINE DENTAIRE.

ANNEE UNIVERSITAIRE 2015/2016

MODULE D'EMBRYOLOGIE. Dr ZOUBIR. H, Dr HAZI. R, Dr RAHAL.D, Dr HAMOUM.F

LES ANNEXES EMBRYONNAIRES

I. Introduction.

II. Amnios et cavité amniotique :

- 1- Formation de l'amnios.
- 2- Physiologie du liquide amniotique.
- 3- Rôle du liquide amniotique.

III. La vésicule vitelline :

- 1- Formation et évolution de la vésicule vitelline.
- 2- Rôle de la vésicule vitelline.

IV. L'allantoïde :

- 1- Formation de l'allantoïde.
- 2- Rôle de l'allantoïde.

V. Le placenta :

- 1- Généralités.
- 2- Evolution des villosités choriales.
- 3- Formation de la coque cytotrophoblastique.
- 4- Unité fœto-placentaire.
- 5- Muqueuse utérine maternelle : les caduques.
- 6- Circulation fœto-placentaire.
- 7- Physiologie du placenta.

VI. Le cordon ombilical :

- 1- Structure du cordon ombilical.
- 2- Rôle du cordon ombilical.

UNIVERSITE D'ALGER - FACULTE DE MEDECINE ZIANIA CHATEAUNEUF – DEPARTEMENT DE MEDECINE. PREMIERE ANNEE DE MEDECINE ET DE MEDECINE DENTAIRE.

ANNEE UNIVERSITAIRE 2015/2016


MODULE D'EMBRYOLOGIE. Dr ZOUBIR. H, Dr HAZI. R, Dr RAHAL.D, Dr HAMOUM.F

I. Introduction :

Les annexes embryonnaires (ou annexes fœtales) sont des structures qui, au cours du développement de l'embryon puis du fœtus, se forment en parallèle. Elles assurent les fonctions vitales de respiration, de nutrition et d'excrétion. Ces annexes embryonnaires prennent place entre le fœtus et l'utérus de la mère. Ils seront éliminés au moment de la naissance.

Les annexes embryonnaires sont représentées par:

- **L'amnios** : c'est une membrane délimitant la cavité amniotique, dans laquelle se trouve le liquide amniotique, elle tapisse la paroi interne du placenta.
- **La vésicule vitelline** : c'est au niveau de sa paroi que vont apparaître les îlots angio-formateurs ainsi que les premières cellules sexuelles (gonocytes primordiaux).
- **L'allantoïde** : participe à la formation du cordon ombilical.
- **Le placenta** : assure les échanges entre la mère et le fœtus.
- **Le cordon ombilical**: il relie le placenta au fœtus.



Coupe sagittale d'un embryon humain de 04 semaines.

UNIVERSITE D'ALGER - FACULTE DE MEDECINE ZIANIA CHATEAUNEUF – DEPARTEMENT DE MEDECINE. PREMIERE ANNEE DE MEDECINE ET DE MEDECINE DENTAIRE.

ANNEE UNIVERSITAIRE 2015/2016

MODULE D'EMBRYOLOGIE. Dr ZOUBIR. H, Dr HAZI. R, Dr RAHAL.D, Dr HAMOUM.F

II. Amnios et cavité amniotique :


1- Formation de l'amnios :

Vers le 8^e jour de la gestation, l'épiblaste se creuse d'une petite cavité qui en s'agrandissant donne la cavité amniotique. Son plafond est tapissé par les amnioblastes (cellules aplaties adjacentes au cytotrophoblaste) c'est **l'amnios**.

Son plancher est formé par l'épiblaste qui se trouve en continuité avec l'amnios. L'amnios est un sac qui entoure l'embryon puis le fœtus.

Au 17^{ème} jour du développement embryonnaire, l'embryon et ses annexes comprennent donc 3 cavités :

- la cavité amniotique.
- la vésicule vitelline secondaire, qui se forme à partir de la vésicule vitelline primaire.
- La cavité chorale (Le coelome extra embryonnaire)



Evolution de la vésicule vitelline primaire.

Au cours de la 4^e semaine, La cavité amniotique augmente considérablement de volume au détriment du coelome externe débordant l'embryon en avant, en arrière et sur les côtés.

2- Physiologie du liquide amniotique :

Le liquide amniotique est un liquide clair, aqueux, sécrété par les cellules amniotiques. Une partie importante provient du fœtus (par la peau, le cordon

UNIVERSITE D'ALGER - FACULTE DE MEDECINE ZIANIA CHATEAUNEUF – DEPARTEMENT DE MEDECINE. PREMIERE ANNEE DE MEDECINE ET DE MEDECINE DENTAIRE.

ANNEE UNIVERSITAIRE 2015/2016

MODULE D'EMBRYOLOGIE. Dr ZOUBIR. H, Dr HAZI. R, Dr RAHAL.D, Dr HAMOUM.F

ombilical, les poumons et les reins) il est sécrété et éliminé en permanence. Il est constitué d'eau (97%), mais contient aussi du glucose, des lipides et des cellules fœtales et amniotiques ainsi que de l'urine fœtale. Le fait qu'il contienne des cellules fœtales permet le diagnostic prénatal (DPN), grâce à l'**amniocentèse**.

3- Rôle du liquide amniotique :

- Assure la nutrition totale du jeune embryon pendant les 3 premières semaines de la grossesse.
- Il empêche l'adhérence de l'amnios à l'embryon.
- Il permet au fœtus de se mouvoir sans risque, il permet aussi de le protéger des chocs et des bruits extérieurs.
- Il permet la croissance du fœtus dans un environnement à température corporelle.
- Le fœtus avale le liquide amniotique et active ainsi ses reins.

Aux alentours de la 34^e semaine, le liquide amniotique atteint son volume maximal d'environ 1 litre. Un peu avant l'accouchement, lorsque l'utérus se contracte, la poche des eaux se rompt. Le liquide se déverse alors et lubrifie au passage les voies génitales pour faciliter le passage imminent du nouveau-né.

III. La vésicule vitelline :

1- Formation et évolution de la vésicule vitelline :


Au 10^e jour du développement embryonnaire on aura la formation de la vésicule vitelline primitive, limitée par la membrane de Heuser qui se continue avec les bords de l'hypoblaste qui va former son toit. Au 13^e jour, une poussée cellulaire à partir des faces latérales de l'hypoblaste repousse la membrane de Heuser, isolant ainsi une nouvelle cavité: La vésicule vitelline secondaire. Au cours de la 4^{ème} semaine, lors de la plicature de l'embryon, la vésicule vitelline secondaire va subir un étranglement, son toit est constitué par le tube digestif primitif. La vésicule vitelline définitive est un sac, situé 'sous' le ventre de l'embryon, dont la paroi est constituée par l'endoderme doublé extérieurement par la splanchnopleure extra-embryonnaire, communiquant avec le tube digestif primitif par le canal vitellin.

UNIVERSITE D'ALGER - FACULTE DE MEDECINE ZIANIA CHATEAUNEUF – DEPARTEMENT DE MEDECINE. PREMIERE ANNEE DE MEDECINE ET DE MEDECINE DENTAIRE.

ANNEE UNIVERSITAIRE 2015/2016

MODULE D'EMBRYOLOGIE. Dr ZOUBIR. H, Dr HAZI. R, Dr RAHAL.D, Dr HAMOUM.F

Ultérieurement, le canal vitellin devient de plus en plus étroit au fur et à mesure que le développement progresse et finit par s'oblitérer.



Coupe sagittale d'un embryon humain de 08 semaines.

2- Rôle de la vésicule vitelline :

La vésicule vitelline joue un rôle dans la mise en place des éléments vasculaires. Au 21^e jour du développement au niveau des cellules mésenchymateuse qui entourent la vésicule vitelline apparaissent des îlots cellulaires angio-formateurs : c'est les îlots de Wolff et Pander.


Il se formera un épithélium embryonnaire ; des capillaires ainsi que des hématies nucléées.

C'est également au niveau de la paroi de la vésicule vitelline aux alentours de l'allantoïde que vont apparaître les gonocytes primordiaux.

UNIVERSITE D'ALGER - FACULTE DE MEDECINE ZIANIA CHATEAUNEUF – DEPARTEMENT DE MEDECINE. PREMIERE ANNEE DE MEDECINE ET DE MEDECINE DENTAIRE.

ANNEE UNIVERSITAIRE 2015/2016

MODULE D'EMBRYOLOGIE. Dr ZOUBIR. H, Dr HAZI. R, Dr RAHAL.D, Dr HAMOUM.F



Coupe sagittale d'un embryon humain au début de la 4^e semaine du développement.

IV. L'allantoïde :

1- Formation de l'allantoïde :

Au 16^e jour du développement, l'allantoïde se forme, il représente un diverticule caudal de la vésicule vitelline secondaire, en arrière de la membrane cloacale. Il est formé par l'endoderme recouvert par le mésenchyme extra embryonnaire (c'est le pédicule de fixation). Dans le mésenchyme de l'allantoïde se différencient les vaisseaux ombilicaux.

Lors de la 4^{ème} semaine, après la plicature de l'embryon, l'allantoïde sera divisée en deux parties :


- 1. La portion intra-embryonnaire** relie l'allantoïde au cloaque de l'embryon.
- 2. La portion extra-embryonnaire**, dans le pédicule embryonnaire.

UNIVERSITE D'ALGER - FACULTE DE MEDECINE ZIANIA CHATEAUNEUF – DEPARTEMENT DE MEDECINE. PREMIERE ANNEE DE MEDECINE ET DE MEDECINE DENTAIRE.

ANNEE UNIVERSITAIRE 2015/2016

MODULE D'EMBRYOLOGIE. Dr ZOUBIR. H, Dr HAZI. R, Dr RAHAL.D, Dr HAMOUM.F


Puis, vers la 8^{ème} semaine, l'**allantoïde** et la vésicule vitelline sont inclus dans le cordon ombilical où ils finiront par s'oblitérer et donner un cordon fibreux.



Evolution de la vésicule vitelline et de l'allantoïde après la 4^e semaine.

2- Rôle de l'allantoïde :

La partie intra embryonnaire de l'allantoïde donnera naissance à la vessie et à l'urètre. Les vaisseaux allantoïdiens vont persister et formeront **les vaisseaux ombilicaux** qui assureront la liaison entre l'embryon et le placenta.



Evolution de l'allantoïde.

UNIVERSITE D'ALGER - FACULTE DE MEDECINE ZIANIA CHATEAUNEUF – DEPARTEMENT DE MEDECINE. PREMIERE ANNEE DE MEDECINE ET DE MEDECINE DENTAIRE.

ANNEE UNIVERSITAIRE 2015/2016


MODULE D'EMBRYOLOGIE. Dr ZOUBIR. H, Dr HAZI. R, Dr RAHAL.D, Dr HAMOUM.F

V. Le placenta :

1- Généralités :

Le placenta humain possède les caractéristiques suivantes : il est

- Villeux : Constitué de villosités, les villosités choriales ; unités histologiques élémentaires du placenta.
- Chorio-allantoïdien : La circulation placentaire chorale est reliée à la circulation foetale allantoïdienne.
- Hémo-chorial : Dans le placenta, mise en contact directe entre le chorion (les villosités) et le sang maternel.



Rappel sur la structure des villosités choriales.

2- Evolution des villosités choriales :

Le développement des villosités placentaires débute à la 2^e semaine du développement embryonnaire (voir cours 2^e et 3^e semaine). Ensuite l'évolution se fait comme suit :

Un tronc villositaire (grosse villosité de 1^{er} ordre) va donner par *ramification* des **Troncs de 2^{ème} ordre** qui vont se *ramifier* en **Troncs de 3^{ème} ordre**.


UNIVERSITE D'ALGER - FACULTE DE MEDECINE ZIANIA CHATEAUNEUF – DEPARTEMENT DE MEDECINE. PREMIERE ANNEE DE MEDECINE ET DE MEDECINE DENTAIRE.

ANNEE UNIVERSITAIRE 2015/2016

MODULE D'EMBRYOLOGIE. Dr ZOUBIR. H, Dr HAZI. R, Dr RAHAL.D, Dr HAMOUM.F


Les troncs de 3eme ordre qui flottent dans les chambres intervillueuses vont former les **villosités libres**.

Les troncs de 3^{ème} ordre qui vont jusqu'à la plaque basale (prolifération cytotrophoblastique, voir ci-dessous) et forment alors les **villosités crampons**.



3- Formation de la coque cytotrophoblastique :

A l'extrémité de chaque villosité, le cytotrophoblaste déborde le syncytiotrophoblaste, s'étend au contact de la muqueuse utérine et forme la **coque cytotrophoblastique** qui entoure totalement l'embryon.



UNIVERSITE D'ALGER - FACULTE DE MEDECINE ZIANIA CHATEAUNEUF – DEPARTEMENT DE MEDECINE. PREMIERE ANNEE DE MEDECINE ET DE MEDECINE DENTAIRE.

ANNEE UNIVERSITAIRE 2015/2016

MODULE D'EMBRYOLOGIE. Dr ZOUBIR. H, Dr HAZI. R, Dr RAHAL.D, Dr HAMOUM.F

4- Unité fœto-placentaire :


La plaque basale est constituée par :

- le syncytiotrophoblaste,
- le cytotrophoblaste,
- la couche basilaire de la muqueuse utérine (Caduque Basilaire)

La plaque chorale est formée par :

- L'amnios,
- Le mésoblaste (mésenchyme) extra-embryonnaire,
- Le cytotrophoblaste,
- Le syncytiotrophoblaste,

Vers le 4^{ème} mois, des cloisons incomplètes apparaissent formées par le plissement de la plaque basale qui remonte mais n'atteint pas la plaque chorale : ce sont les **septa inter-cotylédonaire**s qui délimitent les **cotylédons**. Le cotylédon est à la fois unité fonctionnelle (par ses échanges sanguins) et unité anatomique (15à25 cotylédons dans le placenta humain) du placenta.



UNIVERSITE D'ALGER - FACULTE DE MEDECINE ZIANIA CHATEAUNEUF – DEPARTEMENT DE MEDECINE. PREMIERE ANNEE DE MEDECINE ET DE MEDECINE DENTAIRE.

ANNEE UNIVERSITAIRE 2015/2016


MODULE D'EMBRYOLOGIE. Dr ZOUBIR. H, Dr HAZI. R, Dr RAHAL.D, Dr HAMOUM.F

5- Muqueuse utérine maternelle : les caduques :

La muqueuse utérine maternelle est modifiée au siège de l'implantation par la réaction déciduale (les décidues). On distingue 03 caduques :

- **caduque basilaire**, en regard de la zone d'implantation, celle-ci se divise en une zone compacte (déciduale) et une zone spongieuse (où se fait le décollement placentaire au moment de l'accouchement).
- **caduque ovulaire ou réfléchi**, entourant l'œuf.
- **caduque pariétale**, sur le reste de la cavité utérine

À la fin du 3^e mois, l'augmentation de volume de la cavité amniotique plaque la caduque ovulaire contre la caduque pariétale, en oblitérant la cavité utérine




6- Circulation fœto-placentaire :

La barrière placentaire regroupe des structures séparant le sang maternel du sang fœtal, et qui doivent donc être franchies lors de l'échange des différentes substances.

UNIVERSITE D'ALGER - FACULTE DE MEDECINE ZIANIA CHATEAUNEUF – DEPARTEMENT DE MEDECINE. PREMIERE ANNEE DE MEDECINE ET DE MEDECINE DENTAIRE.

ANNEE UNIVERSITAIRE 2015/2016

MODULE D'EMBRYOLOGIE. Dr ZOUBIR. H, Dr HAZI. R, Dr RAHAL.D, Dr HAMOUM.F





Barrière Foeto-placentaire:

La barrière placentaire regroupe des structures séparant le sang maternel du sang foetal.
La constitution de la barrière placentaire évolue au cours de la grossesse.

Au premier trimestre elle est formée par le **syncytiotrophoblaste**, le **cytotrophoblaste**, le **mésenchyme** des villosités et la **paroi des capillaires sanguins foetaux**.

A partir du 4^e mois, le **cytotrophoblaste** disparaît peu à peu de la paroi de la barrière placentaire, réduisant ainsi la distance entre les vaisseaux maternels et foetaux.



1 sang maternel, 2 syncytiotrophoblaste, 3 cytotrophoblaste,
4 cellules mésenchymateuses, 5 capillaire foetal, 6 mésoblaste EE

UNIVERSITE D'ALGER - FACULTE DE MEDECINE ZIANIA CHATEAUNEUF – DEPARTEMENT DE MEDECINE. PREMIERE ANNEE DE MEDECINE ET DE MEDECINE DENTAIRE.
ANNEE UNIVERSITAIRE 2015/2016
MODULE D'EMBRYOLOGIE. Dr ZOUBIR. H, Dr HAZI. R, Dr RAHAL.D, Dr HAMOUM.F

7- Physiologie du placenta :

A travers le placenta, les échanges sont constants, sélectifs et ne se font pas toujours dans les 2 sens.

A. La fonction nutritive et excrétrice du placenta :

Il permet les **échanges** entre la mère et l'enfant :

- les gaz du sang (échanges respiratoires par diffusion simple)
- l'eau et les sels minéraux, traversent par diffusion simple.
- les glucides par diffusion facilitée (dans les deux sens avec équilibre de la glycémie fœtale et de la glycémie maternelle),
- les protides, dégradés en acides aminés.
- les lipides, dégradés en acides gras.
- les vitamines hydrosolubles, mais la vitamine K passe mal.

Les transferts placentaires concernent également l'**élimination des déchets** du métabolisme fœtal qui sont rejetés dans le sang maternel puis éliminés (urée, acide urique, créatinine).

B. Fonction protectrice du placenta :

Le placenta se comporte comme un véritable filtre: il empêche le passage des protéines :

- Les immunoglobulines : les protéines maternelles ne traversent pas le placenta, à l'exception des Ig G (fin de grossesse).
- Les hormones polypeptidiques maternelles ou placentaires ne passent pas.

Le placenta est une barrière pour certains agents infectieux : il empêche le passage du V.I.H , du bacille tuberculeux...

(La contamination par le V.I.H . peut se produire lors de l'accouchement par voie basse et durant la lactation).

C. Fonction endocrine du placenta :

Hormones stéroïdes :

- **La progestérone** : Produite par le corps jaune gestatif jusqu'à la fin de la 12^{ème} semaine, ensuite le relais est pris par le syncytiotrophoblaste. Cette hormone intervient dans le maintien de la grossesse.

UNIVERSITE D'ALGER - FACULTE DE MEDECINE ZIANIA CHATEAUNEUF – DEPARTEMENT DE MEDECINE. PREMIERE ANNEE DE MEDECINE ET DE MEDECINE DENTAIRE.

ANNEE UNIVERSITAIRE 2015/2016

MODULE D'EMBRYOLOGIE. Dr ZOUBIR. H, Dr HAZI. R, Dr RAHAL.D, Dr HAMOUM.F

- **Les œstrogènes** : Synthétisés par le corps jaune gestatif puis par le placenta, interviennent dans le maintien de la grossesse et la préparation des glandes mammaires.

Hormones peptidiques :

- **L'H.C.G. (hormone chorionique gonadotrophine):**

Maintient le corps jaune gestatif en vie, synthétisée par le syncytiotrophoblaste. Elle est détectable dans la circulation maternelle à partir du 8^{ème} jour de grossesse.

- **L'H.C.S. (hormone chorionique somato-mammotrophique):**

Elle est synthétisée par le syncytiotrophoblaste, elle se retrouve dans la circulation maternelle vers la 5^{ème} semaine du développement embryonnaire. L'H.C.S. prépare les glandes mammaires à une éventuelle lactation et agit sur la croissance foétale.

VI. Le cordon ombilical :

1- Structure du cordon ombilical :


Le cordon ombilical est une tige conjonctivo-vasculaire engainée par l'amnios, reliant la face foétale du placenta à l'ombilic de l'enfant. Il possède un rôle important de transmetteur entre le placenta et le foetus. Le cordon ombilical contient une sorte de gélatine (gelée de Wharton) dans laquelle baigne la veine ombilicale qui transporte le sang oxygéné et les deux artères ombilicales (comportant du CO₂).

Il est constitué par la membrane amniotique (amnios), emprisonnant le pédicule embryonnaire et le pédicule vitellin (comportant le canal vitellin et la vésicule ombilicale).

UNIVERSITE D'ALGER - FACULTE DE MEDECINE ZIANIA CHATEAUNEUF – DEPARTEMENT DE MEDECINE. PREMIERE ANNEE DE MEDECINE ET DE MEDECINE DENTAIRE.

ANNEE UNIVERSITAIRE 2015/2016

MODULE D'EMBRYOLOGIE. Dr ZOUBIR. H, Dr HAZI. R, Dr RAHAL.D, Dr HAMOUM.F



2- Rôle du cordon ombilical :

- Véhiculer le sang riche en O₂ et contenant des nutriments vers le fœtus par la **veine ombilicale**.
- Véhiculer le sang chargé en CO₂ et en autres déchets du métabolisme fœtal vers le placenta par les **artères ombilicales**.